

CALANDRIA COMÚN – CARANCHO – CARDENAL COPETE ROJO – CARPINCHO – CHINGOLO COMÚN –
CHURRINCHE – COATÍ – COSCOROBA – CUERVILLO DE CAÑADA – CUERVILLO CARA AFEITADA

CALANDRIA COMÚN (*Mimus saturnius*)

La calandria común es un ave muy abundante, de hábitos diurnos. Suele encontrarla en parejas o en grupos familiares habitando montes, lugares con arbustos y árboles junto a espacios abiertos, próximo a la costa e incluso ciudades. La calandria se alimenta de frutas e insectos. Presenta el vientre blancuzco, teniendo el plumaje de tonos parduzcos por lo demás. No muestra dimorfismo sexual aparente.



CALANDRIA COMÚN – CARANCHO – CARDENAL COPETE ROJO – CARPINCHO – CHINGOLO COMÚN –
CHURRINCHE – COATÍ – COSCOROBA – CUERVILLO DE CAÑADA – CUERVILLO CARA AFEITADA

CARANCHO (*Caracara plancus*)

El carancho se lo ve en pareja y es un ave bastante terrícola. Principalmente se alimenta de carroña, pero también come pequeños mamíferos, aves y sus huevos, reptiles e insectos. Su hábitat natural se compone de praderas arboladas, zonas cultivadas, bañados, bordes de lagunas y playas. El carancho tiene las patas y el pico torcido y fuerte, lo cual es típico para aves de presa. Presenta parte de la cabeza negruzca igual a las alas. El cuello es grisáceo. En el pecho y dorso tiene el plumaje rayado en colores blancuzcos y negruzcos pero incluyendo tonos de marrón. No muestra dimorfismo sexual aparente.



CALANDRIA COMÚN – CARANCHO – CARDENAL COPETE ROJO – CARPINCHO – CHINGOLO COMÚN – CHURRINCHE – COATÍ – COSCOROBA – CUERVILLO DE CAÑADA – CUERVILLO CARA AFEITADA

CARDENAL COPETE ROJO (*Paroaria coronata*)

El cardenal copete rojo se encuentra en el monte de parque, praderas arboladas y sierras, alimentándose de semillas y brotes. Anda solo o en pareja, a veces también en pequeños grupos. Tiene la cabeza y el copete rojo. El vientre es blancuzco y la espalda es de color gris. No muestra dimorfismo sexual aparente. Las jóvenes tienen el plumaje en tonos parduscos opacos.



CARPINCHO (*Hydrochoerus hydrochaeris*)

El capibara, chigüire o carpincho es una especie de roedor de la familia de los cávidos, nativa de Sudamérica. Es el roedor viviente de mayor tamaño y peso del mundo. Habita humedales y bosques densos y vive cerca de cuerpos de agua. Es una especie muy social y se puede encontrar en grupos de hasta cien individuos, pero por lo general vive en grupos de diez a veinte individuos. La dieta se compone principalmente de hierba terrestre y la complementa de vez en cuando con plantas acuáticas.



CALANDRIA COMÚN – CARANCHO – CARDENAL COPETE ROJO – CARPINCHO – CHINGOLO COMÚN – CHURRINCHE – COATÍ – COSCOROBA – CUERVILLO DE CAÑADA – CUERVILLO CARA AFEITADA

CHINGOLO COMÚN (*Zonotrichia capensis*)

El chingolo común es un ave muy abundante, de hábitos diurnos. Habita campos arbolados, chacras, parques e incluso centros urbanos. Suele verlo en pareja o en pequeñas bandadas. El chingolo se alimenta de semillas y complementa su dieta con insectos. Se identifica por la cabeza gris con rayas negras y el collar de color naranja. Tiene el vientre y dorso pardo con las alas manchado de negro. La hembra y el macho se ven igual, no existe dimorfismo sexual.

La foto muestra un juvenil que todavía no tiene el plumaje típico del chingolo.



CHURRINCHE (*Pyrocephalus rubinus*)

El churrinche es un ave abundante, de hábitos diurnos. Se suele ver en parejas. Habita praderas con árboles separados también en parques donde se alimenta de insectos. La hembra es amarronada con estrias en el pecho y de ahí totalmente diferente al macho (dimorfismo sexual). El macho se presenta un color rojo fuerte y las alas igual que la cola oscuro. El churrinche es un ave chico y migratoria.



CALANDRIA COMÚN – CARANCHO – CARDENAL COPETE ROJO – CARPINCHO – CHINGOLO COMÚN – CHURRINCHE – COATÍ – COSCOROBA – CUERVILLO DE CAÑADA – CUERVILLO CARA AFEITADA

COATÍ (*Nasua nasua*)

El coatí de colnillada es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los prociónidos que habita predominantemente en las selvas sudamericanas y la parte meridional de Centroamérica. Es un mamífero relacionado con el mapache boreal, pero la especie se caracteriza por hocico largo con algo de cerdo y garras de oso. Su piel es o pardo suave o negra, con vientre más claro, y anillos blanco en la cola en muchos casos. Su cabeza es delgada con una nariz alargada, orejas pequeñas, pies negros, cola larga no prensil usada para balancearse y señalar.



CALANDRIA COMÚN – CARANCHO – CARDENAL COPETE ROJO – CARPINCHO – CHINGOLO COMÚN –
CHURRINCHE – COATÍ – COSCOROBA – CUERVILLO DE CAÑADA – CUERVILLO CARA AFEITADA

COSCOROBA (*Coscoroba coscoroba*)


La coscoroba es un ave gregaria que tiene la vocalización muy fuerte la cual lo dió su nombre en forma de una onamotopeia. Con su plumaje blanco parece un cisne pero es un poco más chica y tiene el pico rojo. Su hábitat son las lagunas de agua dulce y salobre y en ocasiones se puede encontrarlas en los esteros y bañados en la costa marina. Las cascorobas suelen asociarse decenas de ejemplares. Su alimentación se compuesta de vegetales y invertebrados.



CALANDRIA COMÚN – CARANCHO – CARDENAL COPETE ROJO – CARPINCHO – CHINGOLO COMÚN –
CHURRINCHE – COATÍ – COSCOROBA – CUERVILLO DE CAÑADA – CUERVILLO CARA AFEITADA

CUERVILLO DE CAÑADA (*Plegadis chihi*)

El cuervillo de cañada es un ave gregaria de hábitos diurnos. Es muy parecido al cuervillo de cara afeitada pero un poco más pequeño, mide unos 45 cm, y su cara se encuentra cubierta de plumas. Su plumaje es de color marrón, los alas parecen negro-verde brillante. El pico largo y delgado lo uso para atrapar pequeños peces y crustáceos, moluscos e insectos acuáticos. También come vegetales. Su hábitat son los humedales, es un ave común en los quebradas del norte de Uruguay. Aparece sin dimorfismo sexual.



CALANDRIA COMÚN – CARANCHO – CARDENAL COPETE ROJO – CARPINCHO – CHINGOLO COMÚN –
CHURRINCHE – COATÍ – COSCOROBA – CUERVILLO DE CAÑADA – CUERVILLO CARA AFEITADA

CUERVILLO CARA AFEITADA (*Phimosus infuscatus*)

El cuervillo cara afeitada / Pelada es un ave gregaria, abundante y de hábitos diurnos. Tiene el plumaje negro aparte de su cara que no esta cubierta con plumas. El pico largo y delgado le sirve para atrapar insectos acuáticos y pequeños peces. También come moluscos, semillas y vegetales. Su hábitat nural se compuesta de humedales. Los machos y las hembras de esta especie se ven iguales (no dimorfismo sexual).

