

GALLARETA ALA BLANCA – GALLINETA GRANDE – GARCITA BLANCA – GARZA AMARILLA – GARZA BLANCA – GARZA BUEYERA – GATO MONTÉS - GUAZUNCHO

**GALLARETA ALA BLANCA** (*Fulica leucoptera*)

La gallareta ala blanca es la más pequeña de las tres gallaretas de Uruguay. Este ave gregaria es abundante en el sur y sureste y común en el resto del país. La gallareta habita bañados, esteros, lagunas, costas de estuarios y costas oceánicas donde se alimenta de vegetales, incluso plantas subacuáticas. La gallareta ala blanca es parecida a la polla de agua pero mientras la polla tiene el escudo frontal rojo, en la gallareta es de color amarillo.



**GALLINETA GRANDE** (*Aramides ypecaha*)

La gallineta grande se la ve sola o en pareja. Es un ave muy abundante de hábitos diurnos. Habita ambientes diversos próximos o lejos al agua, incluso centros poblados, donde se alimenta de semillas, peces, ranas, frutos e insectos. La gallineta grande no muestra dimorfismo sexual aparente. Las hembras igual a los machos tienen el cuello, la espalda y la barriga de color marrón rojizo, las patas rojas y la cabeza, garganta y pecho son azul grisáceo. Su gran tamaño facilita mucho la identificación.



GALLARETA ALA BLANCA – GALLINETA GRANDE – GARCITA BLANCA – GARZA AMARILLA – GARZA BLANCA – GARZA BUEYERA – GATO MONTÉS - GUAZUNCHO

**GARCITA BLANCA** (*Egretta thula*)

La garcita blanca, es muy común de ver en la costa, unas veces sola y otras en grupos. Es fácil distinguirla, siempre utiliza “calzados” amarillos y su pico es oscuro. Pero como es coqueta combina sus patas con un amarillo facial y espectaculares ojos de igual tonalidad. Es una garza pequeña, de unos cuarenta y cinco centímetros de altura, parecida en tamaño a la bueyera. En época de apareamiento viste también un plumaje especial que le surge en la nuca, pecho y torso, y su cara y sus ojos se tornan de un color naranja. Duerme y cría en colonias que pueden ser compartidas con otras especies. Para alimentarse suele ir caminando, cada tanto queda quieta asechando para atrapar con su pico a gran velocidad la presa. Muchas veces hurga el fondo con sus patas para que aquellos peces, pequeños anfibios, cangrejos etc. muy mal afortunados se muevan y así poder capturarlos. Para ello incluso llega a hundir medio cuerpo. Otras veces tocan sutilmente el agua con su pico para que sus presas crean que se trata de un insecto.



GALLARETA ALA BLANCA – GALLINETA GRANDE – GARCITA BLANCA – GARZA AMARILLA – GARZA BLANCA – GARZA BUEYERA – GATO MONTÉS - GUAZUNCHO

**GARZA AMARILLA** (*Syrigma sibilatrix*)

La garza amarilla se asocia más a hábitats con tierra seca, praderas abiertas con árboles dispersos. Esto no quiere decir que no frecuente zonas húmedas, sí lo hace. Recorre pequeños bajíos inundados como se ve en las fotografías de arriba. Parecen preferir sitios asociados al hombre y es común verlas en pastizales cerca de la costa. Se la puede observar sola o en parejas. Tienen un despliegue nupcial diferente a la de otras garzas. Comienza con un acercamiento de ambos individuos, caminando juntos y haciendo contacto con sus pechos. Suelen ofrecerse ramitas cecas. Realizan vuelos acrobáticos emitiendo sus característicos chiflidos, del cual deviene uno de sus nombres comunes: el chiflón.

Este especie de aves se alimenta de pequeños peces, anfibios, reptiles e insectos y aparece sin dimorfismo sexual.



GALLARETA ALA BLANCA – GALLINETA GRANDE – GARCITA BLANCA – GARZA AMARILLA – GARZA BLANCA – GARZA BUEYERA – GATO MONTÉS - GUAZUNCHO

**GARZA BLANCA** (*Egretta alba*)

La garza blanca grande para épocas de apareamiento, pinta un toque verde en su cara, acompañándolo de un plumaje especial para la ocasión (egretas) que la hace extraordinaria. Tal parece que lo supiera, ya que se pavonea levantando las plumas y su pico al cielo. El macho de esta especie es muy dominante, muy agresivo suele tomar con su pico el cuello de su pareja, acto que puede observarse también entre pichones. Las peleas por el alimento dentro del nido son constantes, la cría más agresiva aleja a su hermano del alimento. La mortandad de pichones por este motivo es habitual, ya que es difícil soportar las estocadas de semejantes picos. Los adultos una vez que los alimentan deben estirar su cuello, dar la espalda e incluso alejarse para evitar el constante acoso de los pichones. El alimento se compone de pequeños peces, anfibios, reptiles e insectos.



GALLARETA ALA BLANCA – GALLINETA GRANDE – GARCITA BLANCA – GARZA AMARILLA – GARZA BLANCA – GARZA BUEYERA – GATO MONTÉS - GUAZUNCHO

**GARZA BUEYERA** (*Bubulcus ibis*)

La garza bueyera es un ave gregaria que recibe su nombre por sus hábitos alimenticios. Suele seguir el ganado esperando que al paso de estos se movilicen los insectos, lombrices y pequeños vertebrados para así darles caza con su potente pico. Es un ave originaria del viejo continente, nadie sabe exactamente como llegó a América, algunos estiman que durante el siglo XIX cruzó el Atlántico desde África. En época de apareamiento esta garza pinta su cabeza, pecho y espalda con un naranja ocráceo, su pico transita desde el rojo, pasando por el anaranjado hasta llegar a amarillo en la punta y sus patas se tornan naranjas. Anida en grandes colonias y el bullicio y peleas son muy frecuentes. No tienen dimorfismo sexual.



GALLARETA ALA BLANCA – GALLINETA GRANDE – GARCITA BLANCA – GARZA AMARILLA – GARZA BLANCA – GARZA BUEYERA – GATO MONTÉS - GUAZUNCHO

**GATO MONTÉS** (*Leopardus geoffroyi*)

El gato montés sudamericano o gato de Geoffroy es una especie de mamífero carnívoro de la familia Felidae. Es probablemente el felino salvaje más común de América del Sur. Esta especie se distribuye en el sudeste de Bolivia, el oeste y sur del Paraguay, el extremo sur de Brasil, todo el Uruguay y casi todo el territorio continental de la Argentina. Habita en numerosos ecosistemas, como estepas de los Andes australes, las Pampas, las estepas patagónicas y el GranChaco. Solo está ausente de bosques húmedos y selvas extensas, aunque vive en selvas en galería. Habita lugares prístinos y con presencia humana, aunque tiende a preferir áreas con cobertura arbórea. Tiene el tamaño de un gato doméstico o apenas más grande, con el cual se han hecho intentos de cruzarlo, pero con muy limitado éxito. Tiene manchas negras en todo el cuerpo, pero el color de fondo, generalmente castaño, varía de región en región: en el norte, lo común es un pardo amarillento; más al sur, el manto es grisáceo. El melanismo es algo común tanto en estado salvaje como en cautiverio. Se alimenta principalmente de roedores, pequeños lagartos e insectos, y ocasionalmente ranas y peces; es el súper-predador de la cadena alimentaria. Aunque la especie parezca sufrir, algunos conservacionistas se preocupan del exceso de caza por su piel.



GALLARETA ALA BLANCA – GALLINETA GRANDE – GARCITA BLANCA – GARZA AMARILLA – GARZA BLANCA – GARZA BUEYERA – GATO MONTÉS - GUAZUNCHO

### **Guazuncho (*Mazama gouazoubira*)**

La **corzuela parda**, también denominada **guazuncho**, **viracho**, **guasuvirá**, **asú virá**, **masuncho**, **sachacabra** o **urina** (*Mazama gouazoubira*), es un cérvido de mediano tamaño nativo de América. Hoy se encuentra algo reducido en su hábitat por la presión cinegética y la destrucción de su hábitat, pero sigue siendo relativamente abundante y no se lo considera en peligro de extinción. El guazuncho no presenta gran dimorfismo sexual; tanto machos como hembras alcanzan entre los 55 y los 65 cm de altura a la cruz, y hasta 110 cm de longitud. Su peso llega a los 30 kg. La coloración varía según la zona, pero suele ser de pardogrisácea a pardorrojiza, con un matiz gris que lo distingue de otras especies de *Mazama*. El guazuncho habita normalmente en zonas boscosas, abiertas o semiabiertas. Se alimenta de brotes tiernos, hojas, hongos y frutos; además, descortezaba el tronco de los árboles para señalar su territorio.

