

LECHUCITA DE CAMPO (*Speotyto cunicularia*)

La lechucita de campo es un ave común que muestra mayor actividad durante el día. Se la puede encontrar en bordes de caminos y en pradera abierta y arbolada, donde se alimenta de artrópodos, pequeños reptiles, mamíferos y anfibios. A diferencia de la mayoría de aves nidifica en madrigueras bajo el suelo. La lechucita de campo presenta la cabeza redonda y el pico, los ojos y las patas de color amarillo. De lejos el plumaje se ve marrón con manchas blancuzcas irregulares. No muestra dimorfismo sexual aparente.



LOBITO DE RÍO (*Lontra longicaudis*)

El lobito de río, es un mustélido de la subfamilia Lutrinae, que se encuentra en Centro y Sudamérica, desde el sur de México hasta Uruguay y el centro de Argentina. El pelaje es pardo, de canela a grisáceo. La nariz es negra. Las patas son relativamente cortas y presentan garras fuertes con uñas robustas y membranas interdigitales. La cola cónica termina en punta. Vive en diferentes hábitats ribereños, incluyendo bosques deciduos y



siempreverdes, sabanas, llanos y pantanales. Es posible que esta especie prefiera los claros, ríos y arroyos de montañas hasta 3000 ms.n.m. y sea menos frecuente en terrenos llanos. Son tanto diurnos como nocturnos solitarios. Se alimentan, básicamente, de peces y de crustáceos.



LORO MARACANÁ (*Aratinga leucophthalma*)

El loro maracaná es un ave muy bullicioso de hábitos diurnos. Se lo ve generalmente en grupos pequeños. La alimentación básica se compone de frutos, flores, granos, semillas e insectos. El loro maracaná habita montes ribereños y montes de quebradas. En Uruguay es localmente común en las quebradas de Rivera y Tacuarembó. No muestra dimorfismo sexual aparente. Tiene el plumaje verde y el pico pálido, algo torcido pero fuerte.

