

**TERO COMÚN** (*Vanellus chilensis*)

El tero común, también llamado tero-tero, es un ave muy territorial y agresivo. Realiza vuelos bajos sobre los intrusos que se acercan de su nido y sus crías. Habita campo abierto, orillas de lagunas, bañados, parques y lugares abiertos en las ciudades. Se alimenta de insectos e invertebrados. El tero se lo ve en pareja o pequeños grupos. No muestra dimorfismo sexual aparente. Tiene el grito bastante fuerte que lo dio su nombre.



**TERO REAL** (*Himantopus himantopus*)

El tero real se lo ve en pareja o en pequeños grupos, habitando lagunas, bañados, esteros, arrozales y playas. Se alimenta de crustáceos e insectos. El tero real tiene las piernas largas y delgadas de color rojo. Su plumaje es negro y blanco. Por la mayoría del año no muestra dimorfismo sexual aparente. Solo en la época de nupcial la parte posterior de la cabeza del macho es negra mientras es blanca en la hembra.



TERO COMÚN – TERO REAL – TIJERETA

**TIJERETA** (*Tyrannus savana*)

La tijereta es un ave abundante, migratoria, de hábitos diurnos. Se la puede encontrar en ambientes rurales incluso pequeños centros urbanos, donde se la ve en pareja. Se reconoce fácilmente por su cola larga que es aún más larga en el macho que en la hembra. Se alimenta de insectos y frutos.

